


UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY
GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCIE ZJADLIWEJ GRYPY
PTAKÓW (HPAI)



Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.



Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.



Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydlem.




Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa.

Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.



Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.



W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługa drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu.



Obserwuj stan zdrowia ptaków.
O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.



Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.

Nieprzestrzeganie wymienionych wylej zaledwie może powodować wzrost zagrożenia grypy ptaków.

- nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmnika);
- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocejące należy jak najczesciej usuwać opadły owoce;
- nie należy tworzyć stucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. okazały elminowac wszelkie maziwe do usunięcia nieszczenioci budynek w inwentarskich umiescic siatki w oknach i otworach, zapieczętować kominy wentylacyjne);
- należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silisy paszowe) pod kątem obecności zwierząt szkodzących np. ochodami dzikich ptaków;
- należy regularnie przetrzymywać zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem dostępu dzikiego ptactwa (przetrzymywać zamkniętych pomieszczeń, zadaszyć itp.);
- stome, która będzie wykorzystywana w chwile sciotkowania należy zapieczętować przed uniemowliliącym kontaktem z dzikim ptactwem.

DO DATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

- karminie i pojeneje gotębi w sposób wyjątkowy dostać ptaków dzikich;
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem osobom utrzymującym drób w chwile przyczepowania, aby nie był zatrudniane w uniemowliliającym kontakcie z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA HODOWCY GOTĘBI POCZTOWYCH

- przejmującej ferma drobiu;
- użwanie odizjelowych ochronnych oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z po każdym kontaktcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk woda z mydlem;
- zaobserwowanie spadku niesności lub nagły, zwłaszcza padającego drobiu;
- zgłoszenie lekarzowi weterynarowi, wojtowi, burmistrzowi, innym organom wadzy lokalnej (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- unikanie pojenia ptaków i czyszczania kurników wodę pochodzące spora gospodarstwa przykryciem, uniemowliliającym kontaktem z dzikim ptactwem;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym kontaktem, uniemowliliającym kontaktem z dzikim ptactwem;
- odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;

- karminie i pojeneje drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemowliliwienia ptaki dzikie;
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemowliliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- karminie i pojeneje drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

ZALECENIA DLA DRONOTWAROWYCH HODOWCYH DRÓBIU - GŁÓW PRZYZAGRODOWY